

Ueber *Brachyrrhynchus centralis* Berg.

Von Dr. E. Bergroth in Forssa (Finnland).

Als ich in den Verh. d. Zool. Bot. Ges., Wien, XXXVI, pag. 59, die Vermuthung aussprach, es wäre diese Art vielleicht nur eine der vielen Varietäten des sehr veränderlichen *Brach. granuliger* Stål, war mir die Art in natura noch unbekannt. Da vor Kurzem Prof. Berg die Freundlichkeit hatte, mir die Aradiden seiner Sammlung, sowie der der Universität zu Buenos Aïres zu übermachen, so belehrten mich die Typen-exemplare des Autors, dass ich mit dieser Vermuthung nicht das Richtige getroffen hatte; denn es erwies sich, dass die Art mit *Brach. granuliger*, womit sie Berg in seiner Beschreibung vergleicht, keine Verwandtschaft hat. Sie ist in der That gar kein *Brachyrrhynchus*, sondern ein *Neuroctenus*, und zwar eine mir bisher unbekannte Species, die ich hier als Nachtrag zu meiner Revision dieser Gattung beschreibe. Die Art ist neben *N. punctulatus* Burm. zu stellen.

Neuroctenus centralis Berg.

Elongatus, antrorsum leviter angustatus, opacus, piceus vel rufopiceus; antennae crassiusculae, capite fere dimidio longiores, articulo primo clavato, ceteris crassiore, tertio secundo longiore et primo subaequali vel perpaullo brevior, articulo quarto secundo longitudine aequali; processus capitis apice evidentius excisus; spinae postantennales breviusculae, extus subparallelae; dentes postoculares obsoletae; pronotum longitudinaliter obsolete quadri-impressum, lateribus leviter rotundatis vel ante medium obsoletissime sinuatis, angulis anticis obtusis, haud prominulis, angulis posticis retrorsum obtuse prominulis; corium margine apicali intus profunde sinuatum; membrana nitidiuscula, fusca, basi lutescens; pedes breviusculi, granulati, femoribus incrassatis.

Long. ♂ $5\frac{1}{2}$ mm, ♀ $6\frac{1}{2}$ —7 mm.

Mas: segmento quinto ventrali margine apicali late sinuato, medio subrotundato; segmento sexto abdominali lateribus late emarginatis, angulis posticis distincte rotundato-prominulis.

Femina: segmento quinto ventrali ante valvulas genitales leviter bisinuato.

Brachyrrhynchus centralis Berg, Hem. Arg. pag. 139.

Habitat rem publicam argentinam.